

PROGRAMME DE PROTECTION FRAISE 2010



PERIODE	MALADIE ou RAVAGEUR	TRAITEMENT (dose / are)	REMARQUES
Jusque 1 mois avt la plantation	Verticillium ou verticilliose (flétrissement)	Solasan 7,5 l	désinfection du sol
Directement après plantation	Verticillium, Phytophthora: pourriture du collet et pourriture rouge des racines	Topsin M 70 WG 0,25 g par plante + Fenomenal 0,075 g par plante	arrosage
Début sept (après observation)	pucerons	Calypso 2,5 ml	en plein air: rajouter Trend90
2ème semaine de sept	oïdium	Flint 1,5 g	Rajouter Topaz 5 ml ou Systhane 24 EC 2,5 ml si curatif
fin sept	tarsonème et araignée jaune	Envidor 4 ml + Vertimec 12,5 ml	
octobre	oïdium	Flint 1,5 g	
février	Botrytis et Rhizoctonia	retirer le plastic anti-gel puis traiter avec Pomarsol WG 25 g + Teldor 15 g	
arrosage en début d'année	Verticillium, Phytophthora: pourriture du collet et pourriture rouge des racines	Topsin M 70 WG 0,25 g par plante + Fenomenal 0,075 g par plante	arrosage
avril	Oïdium, Botrytis, Colletotrichum	Topaz 5 ml + Pomarsol WG 25 g + (Teldor 15 g)	avant l'ouverture des premières fleurs
fin avril	forte infestation d'acariens	Sanmite 3,75 g (ou Envidor 4 ml si pas fait avant l'hiver)	
juste avt la floraison	pucerons (aussi contre punaise et anthonome du fraisier)	Calypso 2,5 ml	en plein air: rajouter Trend90
début floraison	Botrytis	Pomarsol WG 20 g + Switch 10 g	
lors de l'observation de thrips	thrips	Tracer 2 ml	(uniquement sous protection)
25% floraison	Botrytis	Scala 20 ml ou Frupica 6 g	
pleine floraison	Botrytis, Colletotrichum, oïdium,	Teldor 15 g + Fortress 2,5 ml	par forte pluie pdt la floraison, le risque de pourriture augmente; répéter!
premiers fruits verts	Limaces, Harpale (Harpalus pubescens)	Mesurol Pro 30 g	
75% floraison	Botrytis	Teldor 15 g	
fin floraison	Botrytis, Colletotrichum, oïdium,	Switch 10 g ou Signum 18 g	
juste avant la 1ère cueillette	Botrytis	Teldor 15 g	l'effet longue durée de Teldor garantit une conservation optimale
entre les cueillettes (période pluvieuse)	Botrytis	Teldor 15 g	délai avant récolte: 1 jour
DESHERBAGE			
14 jours après la plantation	dicotylées	Phenmedifame 12 ml + Devrinol 10 ml	sur mauvaises herbes en germination
mi septembre	dicotylées	Phenmedifame 15 ml	sur nouvelles repousses
avant la floraison	dicotylées et graminées	Basta S 75 ml/are de bande par temps ensoleillé	avec protection entre les lignes, ne pas utiliser sur rejets ou stolons

Basta S: nr.agr. 8464/B, 150 g/l glufosinate d'ammonium, marque déposée Bayer CropScience

Calypso: nr.agr. 9352/B, 480 g/L thiacloprid, marque déposée Bayer CropScience

Cascade DC:marque déposée BASF

Confidor 200SL: nr.agr. 8686/B, 200 g/l imidacloprid, marque déposée Bayer CropScience

Envidor: nr.agr. 9409/B, 240g/l spirodiclofen, marque déposée Bayer CropScience

Exact: nr.agr. 7544/B, 50 g/l triadimenol, marque déposée Bayer CropScience

Flint: nr.agr. 9144/B, 50% trifloxystrobine, marque déposée Bayer CropScience

Frugico: marque déposée Globachem

Geyser:marque déposée Syngenta

Insegar 25WG:marque déposée Syngenta

Peropal: marque déposée Arysta

Phytocap Bayer WG: nr.agr. 9190/B, 80% captan, marque déposée Bayer CropScience

Pirimor WG: marque déposée Syngenta

Runner: nr.agr. 9399/B, 240 g/l methoxyfenozide, marque déposée Bayer CropScience

Scala: marque déposée BASF

Sunspray 7E: marque déposée Sun Oil Company

Surround: marque déposée

Topsin M 70WG: nr.agr. 8666/B, 70% thiofanate-méthyle, marque déposée Nippon Soda

Trend 90: erk. Nr 9002/B, marque déposée Dupont

Weedazol SL: marque déposée Nufarm