

SPUITSCHEMA AARDBEIEN 2010



TIJDSTIP	ZIEKTE of PLAAG	BEHANDELING (dosis / are)	OPMERKINGEN
Tot 1 maand voor het planten	Verticillium	Solasan 7,5 l	Grondontsmetting
Direct na het planten	Verticillium, Phytophthora's	Topsin M 70 WG 0,25 g per plant + Fenomenal 0,075 g per plant	Aangieten
Begin sept (na vaststelling)	Luizen	Calypso 2,5 ml	In openlucht: Trend toevoegen
2 ^{de} week september	Witziekte	Flint 1,5 g	Topaz 5 ml of Systhane 24 EC 2,5 ml Toevoegen indien curatief
Einde sept	Spint en aardbeimijt	Envidor 4 ml + Vertimec 12,5 ml	
October	Witziekte	Flint 1,5 g	Topaz 5 ml of Systhane 24 EC 2,5 ml Toevoegen indien curatief
Februari	Koprot (Botrytis en Rhizoctonia)	Plastiek-afdekking wegnemen en behandelen met Pomarsol WG 25 g + Teldor 15 g	
Aangieten bij begin groei	Verticillium, Phytophthora	Topsin M 70 WG 0,25 g per plant + Fenomenal 0,075 g per plant	Aangieten
April	Witziekte, Botrytis, Colletotrichum	Topaz 5 ml + Pomarsol WG 25 g + (Teldor 15 g)	Voor het openen van de eerste bloemen
Einde april	Hevige druk van spint	Sanmite 3,75 g (of Envidor 4 ml indien niet voor de winter)	
Kort voor de bloei	Luizen (ook wantsen, witte vliegen en bloesemkever)	Calypso 2,5 ml	In openlucht: Trend toevoegen
Begin bloei	Botrytis	Pomarsol WG 20 g + Switch 10 g	
Wanneer trips aanwezig	Trips	Tracer 1,5 ml	(alleen onder bescherming)
25% bloei	Botrytis	Scala 20 ml of Frupica 6 g	
Volle bloei	Botrytis, Colletotrichum, witziekte	Teldor 15 g + Fortress 2,5 ml	Bij hevige regen tijdens de bloei verhoogt het risico voor vruchtrot; herhalen!
Eerste groene vruchten	Loopkevers, slakken	Mesuroil Pro 30 g	
75% bloei	Botrytis	Teldor 15 g	
Einde bloei	Botrytis, Colletotrichum, witziekte	Switch 10 g of Signum 18 g	
Juist voor de eerste pluk	Botrytis	Teldor 15 g	De goede nawerking van Teldor zorgt voor een optimale bewaring
Tussen de plukbeurten (regenachtig periode)	Botrytis	Teldor 15 g	Voorooftinterval: 1 dag
ONKRUIDBESTRIJDING			
14 dagen na de pluk	Tweezaadlobbigen	Fenmedifam 12 ml + Devrinol 10 ml	Op kiemend onkruid
Half september	Tweezaadlobbigen	Fenmedifam 15 ml	Bij nieuwe opkomst
Juist voor de bloei	Tweezaadlobbigen en grassen	Basta S 75 ml/are strook bij zonnig weer	Met beschermkap tussen de rijen, niet gebruiken op uitlopers

Basta S: reg.n° 8464/B, 150 g/l ammoniumglufosinaat, gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience
Calypso: reg.n° 9352/B, 480 g/L thiacloprid, gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience
Fenomenal : reg.n°9500/B, 60% fosethyl-Al & 6% fenamidone, gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience
Fortress : gedeponeerd handelsmerk DowAgroScience
Frupica: gedeponeerd handelsmerk Certis
Horizon EW: reg.n° 8354/B, 250 g/l tébuconazole, gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience
Mesurool Pro : reg.n° 9210/B, 4% methiocarb, gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience
Phytocap Bayer : reg.n° 9190/B, 80% captan, gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience
Pomarsol WG: reg.n° 7651/B, 80% thiram, gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience
Sanmite : gedeponeerd handelsmerk Protex
Scala : gedeponeerd handelsmerk Basf
Signum : gedeponeerd handelsmerk Basf
Solasan : reg.n° 6412/B, 510 g/l metan-natrium, gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience
Systhane 24 EC : gedeponeerd handelsmerk DowAgroScience
Switch: gedeponeerd handelsmerk Syngenta
Teldor: reg.n° 9059/B, 50% fenhexamid, gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience
Topaz : gedeponeerd handelsmerk Syngenta
Topsin M 70WG : reg.n° 8666/B, 70% thiofanaat-methyl, gedeponeerd handelsmerk Nippon Soda
Tracer : gedeponeerd handelsmerk DowAgroScience
Vertimec : gedeponeerd handelsmerk Syngenta