

## Bestrijdingsschema kers 2010

dosis per ha grondopp. (inclusief wendakker)

Tijdstip	Ziekte of plaag	Behandeling	Opmerkingen
Zwellende knop groene knop	bacteriekanker ( <i>Pseudomonas</i> ) en overwinteringsvormen <i>Monilia</i> (vruchtmummies), roestmijt bladluis, rupsen	koperhydroxide 3Kg + zwavel 4Kg Karate 0,16L	
begin witte knop volle bloei einde bloei (bij aanhoudende regens)	Bloesem- <i>Monilia</i> & twijgsterfte Bloesem- <i>Monilia</i> & twijgsterfte Bloesem- <i>Monilia</i> & twijgsterfte + bladstand	Pomarsol WG 3 Kg + ureum 3Kg Pomarsol WG 3Kg + Horizon 0,8L + Boor Pomarsol WG 3Kg + Horizon 0,8L + Boor	bij lage T° (< 12 °C) doorgaan met Pomarsol WG curatieve werking bij t° > 12°C
direct na de bloei 7 dagen na de bloei 14 dagen na de bloei 1 maand na bloei - einde mei verkleuren van de vruchten 14 dagen later (op waarneming)	bladluis, wantsen bladstand hagelschotziekte- <i>Stigmia carpophila</i> , roestmijt bladvalziekte ( <i>Coccomyces hiemalis</i> ) kersenvlieg (cfr. gele kruisval ), bladluis, vruchtmonilia (regenrijke periode) kersenvlieg - bij aanhoudend hoge aantallen in de gele kruisval	Calypso 0,4 L Pomarsol WG 3Kg + bitterzout 7Kg + ureum 3Kg + Boor zwavel 6Kg + Zink Syllit 1,6L + bitterzout 7Kg + ureum 3Kg Calypso 0,4L + Phytocap Bayer WG 2Kg Perfekthion S 1L + Teldor 1,6Kg	wachttijd voor de oogst 14 dagen!
7 dagen voor de pluk 3 dagen voor de pluk	Botrytis, vrucht- <i>Monilia</i> , anti-barst Botrytis , vrucht- <i>Monilia</i> , anti-barst	Switch 1Kg + Platina 1,5L Teldor 1,6Kg + Platina 1,5L	wachttijd 4 dagen Teldor vernevelen met fijne spuitdop en met 300 L water / Ha om geen visueel residu na te laten. Wachttijd 3 dagen
na de pluk 10 dagen later bij bladval bij bladval	bladvalziekte ( <i>Coccomyces hiemalis</i> ) bladvalziekte ( <i>Coccomyces hiemalis</i> ) bacteriekanker ( <i>Pseudomonas</i> ) bacteriekanker ( <i>Pseudomonas</i> )	Syllit 1,6L + ureum 5Kg + bitterzout 10Kg + Boor Syllit 1,6L + Zink koperhydroxide 3Kg koperhydroxide 3Kg	

# Bestrijdingsschema kers 2010

## ONKRUIDBESTRIJDING

Dosis per behandelde Ha (delen door 2 voor dosis per Ha strook)

voorjaar		linuron 1L	
zomer		Basta S 5 L	Toepassen bij zonnig weer. Indien ook doorlevende onkruiden: groeihormoon bijmengen. Vanaf 3 jaar na planten.
na pluk		Basta S 5 L	Vanaf 3 jaar na planten

De vermelde gegevens zijn naar best vermogen samengesteld voor een gemiddeld teeltseizoen en berusten op praktijkervaring van eigen proefveldwerking en observaties. Ze worden louter informatief aangeboden. De gebruiker dient inzake gewasbeschermingsmiddelen steeds kennis te nemen van de gebruiksaanwijzing en van elke voorzorgsmaatregel zoals die voorkomt op het etiket van de gewasbeschermingsmiddelen. Gelieve er rekening mee te houden dat een modern bestrijdingsschema niet statisch is, maar in functie van elk seizoen dient bijgestuurd.

Bayer CropScience kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch voor de eventuele ondoeltreffendheid van een of ander middel, vermeld in dit spuitschema, noch voor de gebeurlijke ongevallen die zouden te wijten zijn aan het gebruik ervan. Voor bijkomende vragen, gelieve de raad van uw handelaar in te winnen.

### Samenstelling producten

Basta S: erk. nr. 8464/B, 150 g/l ammoniumglufosinaat, gedeponeed handelsmerk Bayer CropScience

Calypso: erk. nr. 9352/B, 480 g/L thiacloprid, gedeponeed handelsmerk Bayer CropScience

Horizon EW: erk. nr. 8354/B, 250 g/l tebuconazol, gedeponeed handelsmerk Bayer CropScience

Karate: gedeponeed handelsmerk Syngenta

Platina: gedeponeed handelsmerk Globachem

Pomarsol WG: erk. nr. 7651/B, 80% thiram, gedeponeed handelsmerk Bayer CropScience

Switch: gedeponeed handelsmerk Syngenta

Teldor: erk. nr. 9059/B, 50% fenhexamid, gedeponeed handelsmerk Bayer CropScience

Trend 90: gedeponeed handelsmerk Dupont

Weedazol SL: gedeponeed handelsmerk Nufarm

Perfekthion S: erk. Nr. 4858/B 500g/l dimethoat, gedeponeed handelsmerk BASF