

Bestrijdingsschema peer 2010

Dosis per ha standaardboomgaard (inclusief wendakker)

| Tijdstip | Ziekte of plaag | Behandeling | Opmerkingen | |
|--|--|--|---|---|
| schuivende knop (eind februari) | kanker, takschurft | koperoxychloride 3Kg +/- spuitzwavel 2,5Kg | Decis EC tegen volwassen perenbladvlo | |
| | perenbladvlo | Sunspray 7E 10L of Surround 30Kg (tegen zonnebrand) of Decis EC 0,5L later | | |
| zwellende knop | schurft | dodine 2L | | |
| muizenoor | schurft , perenbladvlo | Phytocap Bayer WG 2,2Kg + Decis EC 0,5L | | |
| groene kluster | schurft | Scala 0,75L + Phytocap Bayer WG 1,5Kg | | |
| groene knop | schurft, kanker | Phytocap Bayer WG 1,8Kg | | |
| kort voor bloei | larven perenbladvlo, luizen, wantsen | Calypso 0,375L + Trend 0,05% | | |
| witte knop | schurft | Phytocap Bayer WG 1,5Kg +/- Geyser 0,15L | | |
| ballonstadium (facultatief bij snelle fenologie) | schurft, kanker | Phytocap Bayer WG 1,5Kg +/- Geyser 0,15L | | T° > 12 °C voor Geysers en alleen bij zwaar schurftinfectiegevaar |
| 30 % bloei (facultatief) | zetting bevorderend of parthenocarpie (bij vorst) | GA-3 | | |
| volle bloei | schurft | Pomarsol WG 3Kg +/- Geysers of Scala (T<12 °C) | (5 pillen voor < 5 jaar ouderdom Conference); > 5 jaar in functie van bloembot, bloeiklimatologie | |
| einde bloei | schurft, zwartrot, perenroest, witziekte, bladrollers, wintervlinder | Flint 0,15Kg + Phytocap Bayer WG 1,5Kg + Runner 0,6L | | |
| begin mei | schurft, zwartrot, perenroest, witziekte, fruitmot | Flint 0,15Kg + Phytocap Bayer WG 1,5Kg + Insegar 0,6Kg | Op percelen die gevoelig zijn aan dode bot. 3 Behandelingen met 2 weken interval spuittechniek! | |
| vanaf 1 week na einde bloei | dode bot (Pseudomonas) | Aliette 3 X 3,75Kg | | |
| Gele eitjes perenbladvlo /Schildluismigratie | Perenbladvlo, schildluis, spint, roestmijt | Envidor 0,6L + Trend 0,05% | | |
| Ontluiking perenbladvlo | Perenbladvlo, schildluis | Movento 2,25L | Nawerking van 3 - 4 weken! | |
| 3de week van mei | schurft, zwartrot, perenroest, witziekte, roestmijt en spint, fruitmot | Flint 0,15Kg + Phytocap Bayer WG 1,5Kg + Cascade 0,75L | Cascade mogelijks wisselen met Runner | |
| | naijende ontluiking L1- larven perenbladvlo | Vertimec 0,75L | | |
| juni | schurft, zwartrot, fruitmot | Pomarsol 3Kg + Runner 0,6L | Vertimec 10-14 dagen na Envidor (indien geen Movento gezet). | |
| juli | schurft, zwartrot | Pomarsol 3Kg + Geysers 0,15L | | |
| september | bewaarziekten | Pomarsol 3Kg | | 5 weken voor pluk |
| | bewaarziekten | Frugico 1,5L + Topsin M 70WG 1,1Kg | | 2 weken voor pluk |
| | bewaarziekten | Bellis 0,8Kg | 1 week voor pluk | |
| | bewaarziekten | Switch 0,75Kg | 3 dagen voor pluk | |
| na de pluk | kanker | Phytocap Bayer WG 2,2Kg + Topsin M 70 WG 1,3Kg | tegen larven tegen volwassenen | |
| | kanker, Pseudomonas | koperoxychloride 3Kg | | |
| | perenbladvlo | Calypso 0,375L + Trend 0,05% of Decis EC 0,5L | | |

Bestrijdingsschema peer 2010

ONKRUIDBESTRIJDING

Dosis per behandelde Ha (delen door 2
voor dosis per Ha strook)

| | | | |
|----------|--|--|---|
| na bloei | | linuron 2L + chloortoluron 3L + Basta S 5L | Basta S toepassen bij zonnig weer |
| zomer | | Basta S 5L | Indien ook doorlevende onkruiden: groeihormoon bijmengen |
| na pluk | | Weedazol SL 10 - 15L | Vanaf 3 jaar na planten |

De vermelde gegevens zijn naar best vermogen samengesteld voor een gemiddeld teeltseizoen en berusten op praktijkervaring van eigen proefveldwerking en observaties. Ze worden louter informatief aangeboden. De gebruiker dient inzake gewasbeschermingsmiddelen steeds kennis te nemen van de gebruiksaanwijzing en van elke voorzorgsmaatregel zoals die voorkomt op het etiket van de gewasbeschermingsmiddelen. Gelieve er rekening mee te houden dat een modern bestrijdingsschema niet statisch is, maar in functie van elk seizoen dient bijgestuurd.

Bayer CropScience kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch voor de eventuele ondoeltreffendheid van een of ander middel, vermeld in dit spuitschema, noch voor de gebeurlijke ongevallen die zouden te wijten zijn aan het gebruik ervan. Voor bijkomende vragen, gelieve de raad van uw handelaar in te winnen.

Samenstelling producten peer:

Basta S: erk. nr. 8464/B, 150 g/l ammoniumglufosinaat, gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience
 Bellis: gedeponeerd handelsmerk BASF
 Calypso: erk. nr. 9352/B, 480 g/l thiacloprid, gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience
 Cascade DC: gedeponeerd handelsmerk BASF
 Confidor 200SL: erk. nr. 8686/B, 200 g/l imidacloprid, gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience
 Envidor: erk. nr. 9409/B, 240g/l spirodiclofen, gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience
 Exact: erk. nr. 7544/B, 50 g/l triadimenol, gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience
 Flint: erk. nr. 9144/B, 50% trifloxystrobine, gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience
 Frugico: gedeponeerd handelsmerk Globachem
 Geysar: gedeponeerd handelsmerk Syngenta
 Insegar 25WG: gedeponeerd handelsmerk Syngenta
 Movento: erk. nr. 9797/B, 100 g/L spirotetramat, gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience
 Phytocap Bayer WG: erk. nr. 9190/B, 80% captan, gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience
 Pirimor WG: gedeponeerd handelsmerk Syngenta
 Runner: erk. nr. 9399/B, 240 g/l methoxyfenozone, gedeponeerd handelsmerk Bayer CropScience
 Scala: gedeponeerd handelsmerk BASF
 Sunspray 7E: gedeponeerd handelsmerk Sun Oil Company
 Surround: gedeponeerd handelsmerk
 Switch: gedeponeerd handelsmerk Syngenta
 Topsin M 70WG: erk. nr. 8666/B, 70% thiofanaat-methyl, gedeponeerd handelsmerk Nippon Soda
 Trend 90: erk. Nr 9002/B, gedeponeerd handelsmerk Dupont
 Vertimec: gedeponeerd handelsmerk Syngenta
 Weedazol SL: gedeponeerd handelsmerk Nufarm